

ANTOX 9

واکسن کشته علیه
بیماری های کلاستریدیایی



SiNARAD
kala

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبائی شمالی
خیابان ۱۶ غربی، پلاک ۴۸، طبقه اول، واحد ۲
۰۲۱۲۲۰۹۶۸۱۱ ☎ ۰۲۱۲۲۱۴۷۲۹۳۰۸

www.sinaradpharma.com
salesinfo@sinarad.com
sinarad_pharma

واکسن ANTOX 9 محصول شرکت Stavropol Biofactory روسیه، یک سوسپانسیون تزریقی کشته علیه بیماری های: انتروتوکسمی، شاربن علامتی، براکسی، هیپاتیت عفونی نکروزان (قانقاریا)، کزاز، ادم بدخیم و اسهال خونی بی هواری است.

شکل واکسن

واکسن به شکل سوسپانسیون شفاف به رنگ زرد تا خاکستری است که به راحتی با تکان دادن هموژن می شود.

ترکیبات واکسن

- ۱. کلستریدیوم پرفرژنس تیپ A
- ۲. کلستریدیوم پرفرژنس تیپ C (B)
- ۳. کلستریدیوم پرفرژنس تیپ D
- ۴. کلستریدیوم شوائی
- ۵. کلستریدیوم سیتیکوم
- ۶. کلستریدیوم سوردرلی
- ۷. کلستریدیوم تتانی
- ۸. کلستریدیوم نوالی تیپ A
- ۹. کلستریدیوم نوالی تیپ B

غیر فعال شده با فرمالین (غلظت ۵/۰ درصد) به همراه ۱۵٪ آلومینیوم هیدرات

حیوانات هدف

گوسفند، بره، بز، بزغاله، گاو و گوساله

موارد مصرف

این واکسن جهت ایجاد ایمنی به مدت ۱۲ ماه علیه بیماری های انتروتوکسمی، شاربن علامتی (black leg)، براکسی، هیپاتیت عفونی نکروزان (قانقاریا)، کزاز، ادم بدخیم و اسهال خونی بی هواری مورد استفاده قرار می گیرد.

دز و نحوه مصرف

گوسفند و بز: ۲ میلی لیتر

گاو و گوساله: ۴ میلی لیتر

برای ایجاد ایمنی علیه بیماری های کلستریدیایی در نوزادان دام های آبستن، ۳۰ تا ۳۵ روز قبل از زایمان واکسیناسیون انجام شود. (کمتر از ۲ هفته مانده به زمان زایمان نباید مصرف شود).

در دام ها با سن ۴۵ روز و بیشتر مصرف شود

تکرار واکسیناسیون در همه دام ها به صورت سالانه انجام گردد. (بره ها و گوساله ها باید یک دوز دیگر در ۶ ماهگی دریافت کنند.)



روش واکسیناسیون

روش توصیه شده واکسیناسیون به صورت زیر جلدی در ناحیه بی مو و پشت مفصل آرنج در گوسفند و بز و در یک سوم پشتی گردن گاوها می باشد. توصیه می شود، پس از مرتبه اول واکسیناسیون دام ها، دز دوم (راپل) در فاصله بین ۲۱ تا ۲۸ روز پس از تزریق دز اول مورد استفاده قرار گیرد و سپس سالیانه یک مرتبه تزریق شود.

توصیه ها و احتیاط های لازم

تزریق این واکسن به دام های ضعیف و یا دارای ضعف سیستم ایمنی مجاز نیست.

در موارد برخورد واکسن به پوست و موکوس، باید سریعاً با آب شسته شود. در صورت تزریق سهوی واکسن به بدن پرسنل، سریعاً محل تزریق با مواد ضدعفونی کننده (یدین ۵ درصد یا الکل ۷۰ درصد) ضدعفونی شده و به نزدیکترین مرکز پزشکی مراجعه شود.

حتماً توجه شود که واکسیناسیون مطابق برنامه ی پیشنهادی انجام گیرد، چرا که نقض برنامه پیشنهادی بر روی کیفیت ایمنی حاصله نسبت به بیماری های کلستریدیایی تاثیر منفی دارد و اگر به هر دلیلی نوبتی از واکسیناسیون انجام نشد، نسبت به انجام آن در سریعترین زمان ممکن اقدام شود.

موارد منع مصرف

ندارد

ندارد

در محل تاریک و در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

طریقه آماده سازی واکسن

ویال واکسن قبل از مصرف تکان داده شود و از سرنگ و سرسوزن استریل برای تزریق استفاده شود.

بسته بندی

واکسن ها با ویال های پلاستیکی یا شیشه ای ۱۰۰ میلی لیتری (۵۰ دزی) و یا ۵۰ میلی لیتری (۲۵ دزی) با درپوش پلاستیکی و کلاهک آلومینیومی قرار دارد.

عمر قفسه ای: ۲ سال

شرکت ثبت کننده و وارد کننده انحصاری در ایران: سیناراد کالا

تولید کننده: شرکت Stavropol biofactory، روسیه

