

FMD VACCINE

واکسن پلی والان کشته تب برقی (آبی)

محصول شرکت آریا روسیه



serumwerk
bismarck



www.sinaradpharma.com

salesinfo@sinarad.com

sinarad_pharma

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبائی شمالی

خیابان ۱۶ غربی، پلاک ۴۸، طبقه اول، واحد ۲

☎ ۰۲۱۲۲۰۹۶۸۱۱

☎ ۰۲۱۲۲۱۴۷۷۹۳۰۸

واکسن تب برفکی آبی محصول شرکت **FGBI ARRIAH** روسیه، یک سوسپانسیون تزریقی از ویروس کشته شده تب برفکی (FMD) حاوی سویه های در گردش کشور ایران شامل: Asia 1 Sindh-08 ، O Panasia-2 ، AG 7.A Iran-05 می باشد.

رنگ واکسن :

صورتی رنگ تا زرد روشن

حیوان هدف:

گاو، بوفالو، گاو میش، شتر، گوزن، گوسفند و بز

موارد مصرف:

این واکسن برای پیشگیری از بروز بیماری تب برفکی (FMD) ناشی از سویه های O Panasia-2 ، AG7 ، A Iran-05 و Asia 1 Sindh-08 و ایجاد ایمنی فعال در گاو، بوفالو، گاو میش، گوسفند و بز استفاده می شود.

دز و نحوه مصرف:

واکسن در ویال های پلاستیکی با حجم ۱۸۰ میلی لیتر (معادل ۶۰ دز گاوی برای گاو و گاو میش، ۱۸۰ دز گوسفندی برای گوسفند و بز) و با حجم ۹۰ میلی لیتر (معادل ۳۰ دز گاوی برای گاو، بوفالو، گاو میش و ۹۰ دز گوسفندی برای گوسفند و بز) می باشد.

● در گله هایی که در مناطق مشکوک به بیماری و مناطق مرزی نواحی دچار همه گیری قرار دارند و واکسیناسیون در گذشته در گله انجام شده است (دارای ایمنی مادری)، واکسیناسیون گوساله ها از سن ۴ ماهگی و بره ها و بزغاله ها از سن ۳ ماهگی آغاز شود و تا سن ۱۸ ماهگی هر ۳ ماه یکبار تکرار گردد و پس از آن هر ۶ ماه یکبار واکسینه شوند.

● در مناطق دچار همه گیری بیماری و گله هایی که سابقه واکسیناسیون ندارند (ایمنی مادری وجود ندارد)، توصیه می شود همه ی حیوانات سالم دز اول واکسن را از روز اول تولد دریافت کرده و دز دوم را تا ۳ هفته بعد دریافت کنند و پس از آن تا سن ۱۸ ماهگی هر ۴ ماه یکبار تکرار گردد و پس از آن هر ۶ ماه یکبار واکسینه شوند. متعاقب واکسیناسیون پاسخ ایمنی فعال علیه بیماری تب برفکی شروع شده و پس از ۲۱ روز به بالاترین میزان خود می رسد.

ترکیبات واکسن:

هر دز واکسن کشته شده حاوی سویه های در گردش کشور ایران شامل: Asia 1 Sindh-08 ، O Panasia-2 ، AG 7.A Iran-05 کشت یافته روی کشت سلولی BHK-21، به میزان 6x10⁶ PD₅₀ هر سروتیپ، به همراه هیدروکسید آلومینیوم و ادجوانت سایونین تولید شده است.

**روش واکسیناسیون:**

- در گاو و گاو میش واکسن در فاصله یک سوم میانی گردن و یا چین های پوستی زیر گردن به صورت زیر پوستی تجویز شود.
- در گوسفند و بز واکسن در بخش میانی ران و بصورت زیر پوستی تزریق شود.

توصیه ها و احتیاط های لازم:

- قبل از استفاده از واکسن، بطری به خوبی تکان داده شود تا سوسپانسیون واکسن به شکل یکنواخت درآید.
- ممکن است در برخی دام ها طی ۱ تا ۳ روز پس از واکسیناسیون افزایش مختصر دمای بدن و کاهش مصرف خوراک مشاهده شود و در محل تزریق تورم به وجود آید که خود محدود شونده بوده و نیاز به درمان خاصی ندارد.
- استفاده همزمان داروهای دیگر همراه با این واکسن منعی وجود ندارد.
- مخلوط کردن واکسن با سایر محصولات دارویی در یک سرنگ مجاز نمی باشد.
- در صورت بروز واکنش های آلرژیک پس از واکسیناسیون، از داروهای آنتی هیستامین و داروهای کاهنده سرعت گردش خون استفاده شود. داروهای مانند دیفن هیدرامین، آدرنالین، آتروپین سولفات و کافئین.

دوره پرهیز از مصرف: ندارد

موارد منع مصرف: ندارد

شرایط نگهداری:

در محل تاریک و در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

طریقه آماده سازی واکسن:

ویال واکسن قبل از مصرف تکان داده شود و از سرنگ و سرسوزن استریل برای تزریق استفاده شود.

بسته بندی:

واکسن ها در ویال های پلاستیکی یا شیشه ای ۱۸۰ و ۹۰ میلی لیتری قرار دارد.

عمر قفسه ای: ۲۴ ماه

شرکت ثبت کننده و وارد کننده انحصاری در ایران: سینارادکالا

تولید کننده: شرکت FGBI ARRIAH، روسیه

