

ARRIAH BVD+IBR+PI3

واکسن سه گانه دامی



SINARAD
kala

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبائی شمالی ☎

خیابان ۱۶ غربی، پلاک ۴۸، طبقه اول، واحد ۲ ☎

www.sinaradpharma.com ☎ ۰۲۱۲۲۰۹۶۸۱۱ ☎ ۰۲۱۲۲۱۴۷۲۹۳۰۸ ☎

salesinfo@sinarad.com ☎

sinarad_pharma ☎

واکسن ARRIAH BVD+IBR+PI3 محصول شرکت روسیه، یک واکسن کشته روغنی علیه بیماری های: اسهال ویروسی گاوان (BVD)، رینوترانکیت عفونی گاوان (IBR) و پارائنفلوآنزا - ۳ گاوان (PI3) موثر می باشد.

رنگ واکسن: سفید مایل به صورتی روشن

ترکیبات واکسن

هر دز واکسن حاوی حداقل 10^7 TCID₅₀ ویروس کشته شده اسهال ویروسی گاوان (BVD)، رینوترانکیت عفونی گاوان (IBR) و پارائنفلوآنزا - ۳ گاوان (PI3) می باشد که با آمینو اتیل آمین غیرفعال شده اند و بصورت خطی روی محیط کشت (BHK) کشت یافته اند، به همراه ادجوانت روغنی مونتالید ISA 70 VG (به نسبت ۷۳٪ به ۲۷٪) تولید شده است.

حیوان هدف: گاو و گوساله

موارد مصرف

این واکسن برای پیشگیری از بروز بیماری های اسهال ویروسی گاوان، رینوترانکیت عفونی گاوان و پارائنفلوآنزا - ۳ گاوان و ایجاد ایمنی فعال در گاو و گاو میش های آلوده و یا در معرض خطر استفاده میشود.

دز و نحوه مصرف

یک دز ایمنی را از واکسن معادل ۲ میلی لیتر تزریق شود. برنامه ی کلی واکسیناسیون برای گاوهای با سنین مختلف به شرح زیر است:

در مرتبه اول واکسیناسیون دام ها، دز دوم (یادآور) در فاصله بین ۲۱ تا ۲۸ روز پس از تزریق دز اول مورد استفاده قرار گیرد سپس واکسیناسیون، هر ۶ ماه یکبار تکرار شود.

بر اساس شرایط، اهداف و استراتژی های پیشگیرانه ی هر گله، واکسیناسیون در گروه های زیر و در زمان بندی های توصیه شده نیز امکان پذیر است:

- گوساله ها: از سنین یک روزگی
- تلیسه ها: از ۱ تا ۱۵ ماه پیش از جفتگیری
- تلیسه های آبستن: ۴۵ تا ۵۰ روز پیش از زایمان
- گاو های آبستن: ۲۰ تا ۲۵ روز قبل از زایمان
- پرواربندی ها: در زمان ورود و ۲۱ تا ۳۰ روز بعد تکرار شود



روش واکسیناسیون

در فاصله یک سوم میانی گردن به صورت عضلانی و تحت شرایط استریل تزریق شود و دز یادآور در فاصله ۲۱ تا ۳۰ روز بعد از دز اول تزریق شود.

توصیه ها و احتیاط های لازم

قبل از مصرف واکسن برای کاهش ویسکوزیته و روان شدن واکسن برای تزریق، ویال واکسن را برای مدت ۳ ساعت در دمای اتاق (۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد) نگهداری کنید و سپس استفاده نمایید.

دامی که قرار است با این واکسن واکسینه شود نباید از ۷ روز قبل تا ۷ روز بعد از زمان واکسیناسیون با واکسن دیگری واکسینه شود.

مخلوط کردن واکسن با سایر محصولات دارویی در یک سرنگ مجاز نیست.

واکسیناسیون مطابق برنامه ی پیشنهادی انجام گیرد، چرا که نقض برنامه پیشنهادی بر روی کیفیت ایمنی حاصله نسبت به بیماری های اسهال ویروسی گاو، رینوترانکیت عفونی گاو و پارائنفلوآنزا - ۳ گاو تاثیر منفی دارد. اگر به هر دلیلی نوبتی از واکسیناسیون انجام نشد، نسبت به انجام آن در سریعترین زمان ممکن اقدام شود.

گوشت، شیر و سایر فرآورده های دامی حیوانات واکسینه شده سالم و بدون هیچ محدودیتی قابل استفاده است.

موارد منع مصرف: ندارد

دوره پرهیز از مصرف: ندارد

شرایط نگهداری

در محل تاریک و در دمای ۸-۲۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

طریقه آماده سازی واکسن

ویال واکسن قبل از مصرف تکان داده شود و از سرنگ و سرسوزن استریل برای تزریق استفاده شود.

بسته بندی

واکسن ها در ویال های پلاستیکی ۱۰۰ میلی لیتری (۵۰ دزی) و ۱۰ میلی لیتری (۵ دزی) قرار دارد.

عمر قفسه ای: ۱۸ ماه

شرکت ثبت کننده و وارد کننده انحصاری در ایران: سینرادفاما تولید کننده: شرکت ARRIAH FGBI، روسیه

