



# Metaphosol

محلول تزریقی مورد استفاده در گاو، اسب، گوسفند و بز، سگ و گربه

متافوسول ۲۰۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر



BREMER PHARMA

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی شمالی، خیابان ۱۶ غربی، پلاک ۴۸، طبقه اول، واحد ۲

[www.sinaradradpharma.com](http://www.sinaradradpharma.com)

[Salesinfo@sinarad.com](mailto:Salesinfo@sinarad.com)

۰۲۱ ۲۲۰۹۶۸۱۱ - ۰۲۱ ۲۲۱۴۷۲۹۳-۸

[sinarad\\_pharma](https://www.instagram.com/sinarad_pharma)



# Metaphosol

(مخلول تزریقی مورد استفاده در گاو، اسب، گوسفند و بز، سگ و گربه)

متافوسول ۲۰۰ میلی‌گرم بر میلی‌لیتر



Metaphosol محصول شرکت Bremer Pharma آلمان یک مخلول تزریقی جهت درمان موارد کمبود فسفر می باشد.



رنگ دارو:

سفید مایل به زرد

ترکیبات دارو:

۱ میلی‌لیتر از دارو حاوی:

تولدیسفوس سدیم تری هیدرات (فسفر آلی) ۲۰۰ میلی‌گرم

حیوانات هدف:

گاو، گاو میش، اسب، گوسفند و بز، سگ و گربه

موارد مصرف:

• برای درمان هیپوفسفاتی حاد مانند: فلجی پس از زایمان،

هموگلوبینوری پس از زایمان، سندرم گاو زمین گیر گرفتگی شدید عضلات ناشی از کمبود منیزیم، ضعف عضلانی، شوک آنافیلاکسی، سخت زایی توصیه میشود.

• همچنین برای درمان شرایط مرتبط با هیپوفسفاتی مزمن مانند: ریگتیز، رشد ناگهانی در حیوانات جوان، نرمی استخوان در حیوانات بالغ و شکستگی، همراه با کلسیم و ویتامین D3 توصیه میشود.

• به عنوان درمان حمایتی در موارد ضعف و زمینگیری ناشی از بیماری، سخت زایی و جراحی توصیه میشود.

• در پیشگیری و درمان گزاز و فلجی ناشی از اختلالات متابولیسم کلسیم و منیزیم همراه با تزریق کلسیم و منیزیم توصیه میشود.

• برای درمان ناباروری و بهبود تخمک گذاری توصیه میشود.

دوز و نحوه مصرف:

برای درمان هیپوفسفاتی حاد:

**گاو، گاو میش، اسب:** ۱۰ تا ۳۰ میلی لیتر در هر حیوان به صورت عضلانی (IM) و یا داخل وریدی (IV) و تکرار تا زمان اثربخشی بالینی حداکثر تا ۱ مرتبه تزریق انجام شود.

**گوسفند، بز:** ۵ تا ۱۵ میلی لیتر در هر حیوان به صورت عضلانی (IM) و یا داخل وریدی (IV) و تکرار تا زمان اثربخشی بالینی حداکثر تا ۱ مرتبه تزریق انجام شود.

**سگ، گربه:** ۰/۲۵ تا ۵ میلی لیتر در هر حیوان به روش تزریق آهسته IV صورت گیرد. پیش از ادامه میزان فسفر سرم بررسی و زمانیکه سطح فسفر سرم به ۲ mg/dl (۲ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر) رسید درمان باید متوقف شود.

برای درمان شرایط مرتبط با هیپوفسفاتی مزمن:

گاو، گاو میش، اسب: ۱۰ تا ۲۵ میلی لیتر در هر حیوان با فاصله ۴۸ تا ۷۲ ساعت به صورت عضلانی (IM) و یا زیرجلدی (SC) و تکرار تا زمان اثربخشی بالینی حداکثر تا ۱ مرتبه تزریق انجام شود.

گوسفند، بز، گوساله و بزغاله: ۲ تا ۵ میلی لیتر در هر حیوان با فاصله ۲۴ تا ۴۸ ساعت به صورت عضلانی (IM) و یا زیرجلدی (SC) و تکرار تا زمان اثربخشی بالینی حداکثر تا ۱ مرتبه تزریق انجام شود.

سگ، گربه: ۱ تا ۳ میلی لیتر در هر حیوان به صورت عضلانی (IM) و یا زیرجلدی (SC) هر ۲ روز تکرار تا زمان اثربخشی بالینی حداکثر تا ۱ مرتبه تزریق انجام شود.

توصیه ها و احتیاط های لازم:

• هنگام مصرف دارو در حیوانات موارد آسپتیک را رعایت کنید.

• تجویز بیش از حد ممکن است منجر به هیپوکسمی و فشار خون بالا شود و باید بلافاصله پس از مشاهده علائم، مصرف دارو قطع شود.

• در حیوانات با کم کاری تیروئید، هیپوکسمی و نارسایی کلیه الیگوریک تزریق نشود.

• با تزریق سریع دزهای زیاد به صورت داخل وریدی ممکن است افت فشار مشاهده شود. در صورت مصرف طولانی مدت، ممکن است نارسایی کلیه یا کنسیفیکاسیون مناساتیک بافت نرم مشاهده شود.

موارد منع مصرف:

ندارد

دوره پرهیز از مصرف:

ندارد

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

پس از ورود اولین سر سوزن دارو تا ۲۸ روز قابل مصرف می باشد.

بسته بندی:

ویال شیشه ای ۵۰ و ۱۰۰ میلی‌لیتری.

عمر فساد ای:

۳ سال

تولید کننده:

شرکت Bremer Pharma، آلمان

SINARAD  
kala

شرکت ثبت کننده و وارد کننده انحصاری در ایران: سیناراد کالا

