

SiNARAD
kala



Hefrotrim

آنتی بیوتیک تزریقی

۲۰۰ میلی گرم سولفادیمیدین / ۴۰ میلی گرم تری متوپریم



SiNARAD
kala



serumwerk
bernburg



BREMER PHARMA

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبائی شمالی، خیابان ۱۶ غربی، پلاک ۴۸، طبقه اول، واحد ۲

www.sinaradpharma.com

Salesinfo@sinarad.com

۰۲۱ ۲۲۰۹۶۸۱۱ - ۰۲۱ ۲۲۱۴۷۲۹۳-۸

[sinarad_pharma](https://www.instagram.com/sinarad_pharma)





Hefrotrim

آنتی بیوتیک تزریقی مورد استفاده در گاو، اسب،

گوسفند، بز، سگ و گربه

آنتی بیوتیک Hefrotrim محصول شرکت Bremer Pharma آلمان یک محلول تزریقی جهت درمان بیماری های باکتریایی و حساس به سولفادیمیدین و تری متوپریم و عفونت های ثانویه باکتریایی همراه یا پس از بیماری های ویروسی می باشد.

رنگ دارو:

زرد شفاف

ترکیبات دارو:

۱ میلی لیتر از دارو حاوی:
سولفادیمیدین: ۲۰۰ میلی گرم
(معادل سولفادیمیدین سدیم ۲۱۵/۸ میلی گرم)
تری متوپریم: ۴۰ میلی گرم

حیوانات هدف:

گاو، اسب، گوسفند، بز، سگ و گربه

موارد مصرف:

این دارو جهت درمان بیماری های باکتریایی و حساس به سولفادیمیدین و تری متوپریم: مانند عفونت های تنفسی، پوست، دستگاه گوارش، مجاری ادراری-تناسلی، عفونت های ثانویه باکتریایی همراه یا پس از بیماری های ویروسی از جمله درگیری در مجاری تنفسی، دستگاه گوارش، زخم ها، عفونت بند ناف و عفونت سم موثر می باشد.

دوز و نحوه مصرف:

اسب: ۱ میلی گرم به ازای ۱۵-۱۰ کیلوگرم وزن بدن (تزریق عضلانی IM، تزریق زیرپوستی SC)
گاو: ۱ میلی گرم به ازای ۱۵-۱۰ کیلوگرم وزن بدن (تزریق عضلانی IM، تزریق وریدی IV، زیرپوستی SC)
گوسفند و بز: ۱ میلی گرم به ازای ۱۵-۱۰ کیلوگرم وزن بدن (تزریق عضلانی IM، تزریق وریدی IV)
سگ و گربه: ۲/۰-۱/۰ میلی گرم به ازای هر یک کیلوگرم وزن بدن (تزریق عضلانی IM، تزریق وریدی IV، زیرپوستی SC)
دارو روزانه یک مرتبه به مدت ۳ تا ۵ روز متوالی متناسب با شدت بیماری مصرف گردد و چنانچه بعد از ۳ روز از شروع مصرف نتایج درمانی مشاهده نشد، تشخیص و درمان مورد بازبینی قرار گیرد.

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان این محصول با کلسیم و دیگر مایعات حاوی پلی یون تداخل دارد و تجویز همزمان با داروهایی مانند فنی تونین می تواند منجر به مسمومیت شود.

توصیه ها و احتیاط های لازم:

- تزریق وریدی به آهستگی انجام شود.
- حجم داروی تزریق شده در هر محل تزریق از ۱۰ میلی لیتر بیشتر نشود.
- قلیایی کردن ادرار سبب دفع سریعتر سولفانامید شده و اسیدی کردن ادرار خطر کریستالوری را افزایش می دهد.
- برای پیشگیری از آسیب کبدی متعاقب کریستالوری، مصرف آب کافی همراه با دارو درمانی ضروری است و در صورت نیاز ادرار را قلیایی کنید.
- در اسب، تجویز وریدی هفروتريم در برخی موارد

- می تواند منجر به شوک شود، بنابراین از مصرف این دارو در اسب به صورت وریدی پرهیز نمایید.
- مصرف ترکیب سولفانامید/تری متوپریم در برخی از اسب هایی که توسط دتوهیدین بیهوش شده اند، می تواند منجر به مرگ حیوان شود.
- مصرف این دارو در حیوانات نابالغ و یا تازه متولد شده می تواند سبب جدا شدن بیلی روبین از پلاسما خون و ظهور علائم ایکتر یا یرقان شود.
- بنابراین این دارو در حیوانات باردار و یا تازه متولد شده با احتیاط تجویز گردد.



Hefrotrim

موارد منع مصرف:

ندارد

دوره پرهیز از مصرف:

گاو (گوشت - امعا و احشا): ۱۴ روز
اسب (گوشت - امعا و احشا): ۸ روز
گوسفند و بز (گوشت - امعا و احشا): ۱۸ روز
شیر گاو: ۴ روز
شیر گوسفند و بز: شش و نیم روز
این دارو در مادیان هایی که شیر آنها مصرف انسانی دارند نباید مصرف شود.

شرایط نگهداری:

در دمای ۲۵-۱۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.
پس از ورود اولین سر سوزن دارو تا ۲۸ روز قابل مصرف می باشد.

بسته بندی:

ویال شیشه ای ۱۰۰ و ۵۰ میلی لیتری

عمر قفسه ای:

۳ سال

تولید کننده: شرکت Bremer Pharma، آلمان

SINARAD
kala

شرکت ثبت کننده و وارد کننده انحصاری در ایران: سیناراد کالا