

# XYLAZIN 2%

محلول تزریقی مورد استفاده درگاو، اسب، سگ و گربه

زایلازیــن هیدروکلرید: ۲۰ میلــی گرم بر میلــی لیتـــر

زایلازین ۲٪ محصول شرکت Serumwerk bernburg آلمان یک محلول تزریقی بوده که جهت آرام بخشـــی، شل شدن عضلات و بی دردی برای جراحی های سرپایی و در ترکیب با سایر داروها جهت بیهوشی مصـــــرف می گردد.

### رنگ دارو:

بی رنگ و شفاف

## ترکیبات دارو:

۱ میلیلیتر از دارو حاوی:

۲۳/۲۷ میلی گرم ماده موثر : زایلازین هیدروکلراید ماده جانبی: متیل- ۴-هیدروکسی بنزوات ۷/۰ میلی گرم

## حيوانات هدف:

گاو، اسب، سگ و گربه

## دز و نحوه مصرف:

### اسب:

۶/۰ تا ۱ میلی گرم زایلازین به ازای هر کیلوگرم وزن، معادل ۳ تا ۵ میلی لیتر از محلول زایلازین به ازای ۱۰۰ کیلوگرم وزن بدن

موارد مصرف:

گاو و اسب:

مصرف می گردد.

به عنوان آرامبخش و شل کننده عضــــــــلات حین انجام

درمان های ساده و کوتاه مدت و به عنوان داروی بیهوشی

و ضد درد در ترکیب با دیگر داروها مصــــرف می شود.

به عنوان آرامبخش بــــرای انجام انواع معاینات (مانند

معاینه رکتال یا انواع تصویر برداری های تشـخیصـی) و

انواع درمان های ساده و کوتاه مدت (مانند جراحی های

ساده، درمان چشـم و گوش و به عنوان داروی بیهوشی،

ضددرد و شل کننده عضلات در ترکیب با دیگر داروها

X 2%

XYLAZIN 20 mg/ml

Injektionslösung für Pferde, Rinder, Hunde, Katzen

## تزریق داخل رگ (۱۷): ۱۶م، تا ۱ میلی گرم زایلازین به ازای هر کیلـوگرم وزن بدن ، معـادل ۰/۰۸ تا ۰/۵ میلی لیتـر از محلول زایلازین به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم وزن بدن( تزریق باید به آهستگی و منطبق با اثرات ظاهرشده، انجام شود) تزریق عضلانی (IM): ۵۰/۰ تا ۳/۰ میلی گرم زایلازین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، معـــادل ۲۵/۰ تا ۱/۵ میلی لیتــر از

تزریق عضلانی(IM)

۱ تا ۳ میلی گرم زایلازین به ازای هر کیلوگـــرم وزن، معـادل ۵/۰تا ۱/۵ میلی لیتر محلول زایلازین به ازای ۱۰ کیلوگــرم وزن

تزریق زیر پوستی (SC) یا تزریق عضلانی (IM)

محلول زایلازین به ازای کیلوگرم وزن بدن

۲ تا ۴ میلی گرم زایلازیــن به ازای هر کیلوگـــرم وزن بدن معادل ۰/۱ تا ۰/۲ میلی لیتــر به ازای یک کیلوگـرم وزن بدن

عمق و شدت اثرات دارو شامل: اثرات آرامبخشی ضعیف تا قوی، شل شدگی عضلات و اثرات ضد درد، به میزان دز مصرفی دارو بستگی دارد.

# توصیه ها و احتیاط های لازم:

- در گاو، اسب، سگ و گربه چنانچه همراه با داروی دیگری (مانند آرامبخش ها و یا داروهای پیش بیهوشی) مصرف شود به دز کمتری از زایلازین نیاز است.
- 🕳 در سگ و گربه در حین انجام امور درمانی ،عمل جراحی و حتی در زمان ریکاوری بعد از عمل، علائم حیاتی حیوان از جمله ضربان قلب و تنفس تا رفع کامل اثرات دارو تحت نظر باشد.
- در سگ، مصرف زایلازین اغلب موجب تولید گاز در دستگاه گوارش می گردد، لذا مصرف زایلازین پیش از رادیوگرافی به جهت تاثیر منفی برروی تفسیر نتایج تصویربرداری، توصیه نمی شود.
- در گاو در موارد مصرف دز بالای زایلازین ،برای پیشگیری از نفخ شکمبه ،باید تا چند ساعت قبل از تزریق ، پرهیز از غــــذا
- در اسب حین انجام عملیـــات درمانی برروی انـــدام های خلفـی اسب برخــلاف اثرات آرامبخش داروی زایلازین، احتمال رفتارهای دفاعی و لگد پرانی وجود دارد.
  - داروی زایلازین در زمان یک سوم آخر آبستنی حیوانات تحت مداوا و بخصوص گاو نباید استفاده شود.

## تداخل اثر دارو و دیگر شکل های تداخل:

- زایلازین همراه با داروی اپی نفرین به علت تشدید علائم آریتمی بطنی، نباید مصرف شود.
- مصرف همزمان زایلازین با دیگر داروهای آرام بخش سیستم عصبی مرکزی مانند: باربیتورات ها، داروهای مخدر و داروهای ضد درد سبب تشدیـــد اثـــرات آرامبخشی در سیستم عصبی مرکزی می شود.لذا دز مصرفی این دسته داروها در مصـــرف همزمان با زایلازین باید کاهش داده شود.
  - اثرات خواسته و ناخواسته زایلازین را با مصرف داروهای آنتاگونیست رسپتورهای 2lpha میتوان کاهش داد.



## مصرف بیش از حد (علائم، اقدامات ضروری، آنتی دت):

اوردز در مصرف زایلازین می تواند سبب بروز آریتمی قلبی، کاهش فشار خون، کاهش فعالیت سیستم عصبی و تنفسی و همچنین تشـنج شود. در صورت ظهور این علائم از تنفس مصـنوعی و استفاده از داروهای محرک سیسـتم عصـبی باید استفاده شود.

## دوره پرهيز از مصرف:

● شیر گاو: ندارد ● اسب (گوشت - امعا و احشا): ۱ روز ● گاو (گوشت - امعا و احشا): ۱ روز این دارو در مادیان هایی که شیر آنها مصرف انسانی دارند نباید مصرف شود.

## شرایط نگهداری:

در دمای ۱۵-۲۵ درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود

عمر قفسه ای: ۲ سال **بسته بندی:** ویال های ۱۰ ، ۲۵ و ۵۰ میلیلیتری

> شرکت ثبت کننده و وارد کننده انحصاری در ایران: سیناراد کالا تولید کننده: شــرکت Serumwerk Bernburg AG ، آلمان













