

# ARRIAH BVD+IBR+PI3

واکسن سه گانه دامی



## SiNARAD kala

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی شمالی  
خیابان ۱۶ غربی، پلاک ۴۸، طبقه اول، واحد ۲  
تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی شمالی، پلاک ۴۸، واحد ۲  
www.sinaradpharma.com  
salesinfo@sinarad.com  
sinarad\_pharma

ARRIAH BVD+IBR+PI3  
Vaccine against bovine viral diarrhoea,  
brucellosis and bovine parainfluenza-3  
واکسن سه گانه دامی علیه امپال و بروسیل و  
پاراینفلوآنزا ۳  
حجم: ۱۰ سی سی معادل ۵ در ۵  
میزان مصرف: ۲ سی سی  
آموزش: در جای تاریک  
در دمای ۸ تا ۱۵ درجه سانتیگراد و در جای خشک  
مصرف: طبق دستورالعمل داخل جعبه  
تاریخ انقضا: در ایران و وارد کننده: شرکت سیناراد  
تهران - آدرس: سعادت آباد - پلاک ۴۸ - واحد ۲  
تلفن: ۰۲۱۲۲۱۴۷۷۲۹۳۸ - ۸  
www.sinarad.com  
only use only  
021-4151-2019  
oie

واکسن ARRIAH BVD+IBR+PI3 محصول شرکت ARRIAH روسیه، یک واکسن کشته روغنی علیه بیماری های : اسهال ویروسی گاوان (BVD)، رینوتراکئیت عفونی گاوان (IBR) و پارائنفلوانزا - ۳ گاوان (PI3) موثر می باشد.

**رنگ واکسن:** سفید مایل به صورتی روشن

## ترکیبات واکسن

هر دز واکسن حاوی حداقل  $10^{6.0}$  TCID<sub>50</sub> ویروس کشته شده اسهال ویروسی گاوان (BVD)، رینوتراکئیت عفونی گاوان (IBR) و پارائنفلوانزا - ۳ گاوان (PI3) می باشد که با آمینو اتیل آمین غیرفعال شده اند و بصورت خطی روی محیط کشت (BHK) کشت یافته اند، به همراه ادجوانت روغنی مونتانید ISA 70 VG (به نسبت ۳۰٪ به ۷۰٪) تولید شده است.

**حیوان هدف:** گاو و گوساله

## موارد مصرف

این واکسن برای پیشگیری از بروز بیماری های اسهال ویروسی گاوان، رینوتراکئیت عفونی گاوان و پارائنفلوانزا - ۳ گاوان و ایجاد ایمنی فعال در گاو و گاو میش های آلوده و یا در معرض خطر استفاده میشود.

## دز و نحوه مصرف

یک دز ایمنی را از واکسن معادل ۲ میلی لیتر تزریق شود. برنامه ی کلی واکسیناسیون برای گاوهای با سنین مختلف به شرح زیر است:

در مرتبه اول واکسیناسیون دام ها، دز دوم (یادآور) در فاصله بین ۲۱ تا ۲۸ روز پس از تزریق دز اول مورد استفاده قرار گیرد سپس واکسیناسیون، هر ۶ ماه یکبار تکرار شود.

بر اساس شرایط، اهداف و استراتژی های پیشگیرانه ی هر گله، واکسیناسیون در گروه های زیر و در زمان بندی های توصیه شده نیز امکان پذیر است:

- گوساله ها: از سن یک روزگی
- تلیسه ها: از ۱ تا ۱/۵ ماه پیش از جفتگیری
- تلیسه های آبستن: ۴۵ تا ۵۰ روز پیش از زایمان
- گاو های آبستن: ۲۰ تا ۲۵ روز قبل از زایمان
- پرواربندی ها: در زمان ورود و ۲۱ تا ۳۰ روز بعد تکرار شود



## روش واکسیناسیون

در فاصله یک سوم میانی گردن به صورت عضلانی و تحت شرایط استریل تزریق شود و دز یادآور در فاصله ۲۱ تا ۳۰ روز بعد از دز اول تزریق شود.

## توصیه ها و احتیاط های لازم

قبل از مصرف واکسن برای کاهش ویسکوزیتی و روان شدن واکسن برای تزریق، ویال واکسن را برای مدت ۳ ساعت در دمای اتاق ( ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد) نگهداری کنید و سپس استفاده نمایید.

دامی که قرار است با این واکسن واکسینه شود نباید از ۷ روز قبل تا ۷ روز بعد از زمان واکسیناسیون با واکسن دیگری واکسینه شود.

مخلوط کردن واکسن با سایر محصولات دارویی در یک سرنگ مجاز نیست.

واکسیناسیون مطابق برنامه ی پیشنهادی انجام گیرد، چرا که نقض برنامه پیشنهادی بر روی کیفیت ایمنی حاصله نسبت به بیماری های اسهال ویروسی گاوان، رینوتراکئیت عفونی گاوان و پارائنفلوانزا - ۳ گاوان تاثیر منفی دارد. اگر به هر دلیلی نوبتی از واکسیناسیون انجام نشد، نسبت به انجام آن در سریعترین زمان ممکن اقدام شود.

گوشت، شیر و سایر فرآورده های دامی حیوانات واکسینه شده سالم و بدون هیچ محدودیتی قابل استفاده است.

**موارد منع مصرف:** ندارد

**دوره پرهیز از مصرف:** ندارد

## شرایط نگهداری

در محل تاریک و در دمای ۲-۸ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

## طریقه آماده سازی واکسن

ویال واکسن قبل از مصرف تکان داده شود و از سرنگ و سرسوزن استریل برای تزریق استفاده شود.

## بسته بندی

واکسن ها در ویال های پلاستیکی ۱۰۰ میلی لیتری (۵۰ دزی) و ۱۰ میلی لیتری (۵ دزی) قرار دارد.

**عمر قفسه ای:** ۱۸ ماه

شرکت ثبت کننده و وارد کننده انحصاری در ایران: سینارادکالا  
تولید کننده: شرکت ARRIAH FGBI، روسیه

