SiNARAD kala

BREMER PHARMA GMBH

Ketamin %10

محلول تزریقی مورد استفاده درگاو، اسب، سگ، گربه، گوسفند، بز، شتر و گاومیش

SiNARAD kala

serumwerk bernburg · INDOVAX · ARRIAH · BREMER PHARMA

تهران، سعادت آباد، خیابان علامه طباطبایی شمالی، خیابان ۱۶ غربی، پلاک ۴۸، طبقه اول، واحد۲

www.sinaradpharma.com

Salesinfo@sinarad.com

۰۲۱ ۲۲۰۹۶۸۱۱ - ۰۲۱ ۲۲۱۴۷۲۹۳-۸

sinarad_pharma

Ketamin %10

BREMER PHARMA GMBH

کتامین ۱۰ % محصول شرکت Bremer Pharma آلمان ، یک محلول تزریقی بوده که جهت القای بیهوشی کوتاه مدت ،بیهوشی عمومی، آرام بخشی و بی دردی برای جراحی های سرپایی و در ترکیب با سایر داروها جهت بیهوشی مصرف می گردد.

رنگ دارو:

بی رنگ و شفاف

ترکیبات دارو:

۱ میلی‌لیتر از دارو حاوی:

کتامین هیدروکلراید: ۱۱۵/۳۴ میلی گرم

حیوانات هدف:

گاو، تک سمیان (اسب و...)، سگ،گربه،گوسفند،بز،بوفالو، شتر و گاومیش

موارد مصرف:

القای بیهوشی کوتاه مدت برای انجام فرآیندهای تشخیصی،

جراحی های کوچک و یا درمان های دردناک مانند:

- جرمگیری و کشیدن دندان
- تخلیه آبسه
- مراقبت و پاکسازی زخم وتعویض بانداژ
- رادیولوژی و تصویر برداری تشخیصی
- آرامبخشی حیوانات بیقرار، هیجان زده و خشن
- کشیدن ناخن و پشم چینی

جهت القای بیهوشی عمومی و سطح پایین هوشیاری در جراحی هایی مانند: دررفتگی ها، قطع عضو، عقیم‌سازی، استریل کردن،

برداشت رحم وتخمدان، لاپاراتومی وگچ‌گیری (اصلاح شکستگی) مورد استفاده قرار میگیرد.

- در جراحی های دردناک و طولانی مدت که نیازمند تداوم و عمق بیهوشی می باشند، ترکیب این دارو با زایلازین، بیهوش کننده های تزریقی یا استنشاقی ضروری است.
- برای القای بیهوشی کوتاه مدت در سگ ها، کتامین باید با آرامبخش ها یا بیهوش کننده های تزریقی یا استنشاقی ترکیب شود.

دز و نحوه مصرف:

گربه:

- در پروسه ها ی جزئی که شلی عضلات مخطط مورد نیاز نیست:مقدار ۲۲-۳۳ mg/kg به روش IM و ۲/۲-۴/۴ mg/kg به روش IV
- مقید کردن: مقدار ۶/۶-۱۱mg/kg به روش IM

سگ:

۰/۱-۰/۲ میلی لیتر به ازای هرکیلوگرم وزن بدن به صورت عضلانی و در صورت استفاده به شکل ترکیبی با دیگر داروهای آرامبخش: ۰/۰۵ میلی گرم Atropin به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت وریدی،عضلانی و زیر جلدی همراه با ۰/۱ میلی گرم Acepromazine به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، بعد از شروع اثرکتامین

برای تزریق در یک دوز ۰/۲ میلی لیتربه ازای هر ۱۰ کیلوگرم وزن بدن استفاده شود.

گاو:

کتامین به تنهایی به میزان ۲ mg/kg برای پروسه های درمانی جزئی به روش IV مورد استفاده قرار میگیرد.

اسب:

کتامین هیدروکلراید به روش IV به میزان ۲/۲ mg/kg به همراه زایلازین به میزان ۱/۱mg/kg به روش IV قبل و یا همزمان با کتامین برای بیهوشی های کوتاه مدت استفاده شود.

گوسفند:

برای تزریق IM به میزان ۱۵-۲۰mg/kg یا مقدار ۱۰-۱۵ mg/kg به صورت تزریق آهسته IV برای جراحی های کوتاه مدت و اعمال فرایندهای تشخیصی،آرامبخشی.

شتر:

ترکیب زایلازین به میزان ۰/۲ mg/kg – ۰/۱۵ و کتامین به میزان۱-۲/۵mg/kg به روش IM در صورت نیاز میتوان بیهوشی را با نصف دوز مذکور از کتامین و زایلازین ادامه داد.

توصیه ها و احتیاط های لازم:

- برای جلوگیری از تشدید افت تنفسی، تزریق داخل عروقی باید آهسته انجام شود (مدت: حداقل ۶۰ ثانیه).
- به دلیل باز بودن چشم ها، برای جلوگیری از خشکی قرنیه پیشگیری مناسب صورت گیرد.(برای مثال استفاده از قطره یا پماد چشمی).
- کتامین در گربه ممکن است باعث افزایش ناچیز دمای بدن شود. دمای بدن به ازای هر دوز درمانی در یک دوره، به طور میانگین ۱/۶ درجه سانتیگراد افزایش می یابد.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۲۵درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم آفتاب نگهداری شود.

بسته بندی:

ویال های ۵۰ و ۲۵ ، ۱۰ میلی‌لیتری.

عمر قفسه ای:

۲ سال

عمر قفسه ای بعد از اولین باز شدن ۷ روز می باشد.

تولید کننده: شرکت Bremer Pharma ، آلمان

شرکت ثبت کننده و وارد کننده انحصاری در ایران: سیناراد کالا

SINARAD kala